

Релятивистская механика в модели 4D-среды

В. Скоробогатов

<http://vps137.narod.ru/physics.html> vps137@yandex.ru

В модели четырехмерной среды определена функция Лагранжа для вихря, которая имеет тот же вид, что и функция Лагранжа свободной частицы в теории относительности.

В работе [1] было показано, что вихрь в четырехмерной среде может служить моделью элементарной частицы, причем видимой скорости перемещения частицы по границе среды, т.е. в видимом трехмерном пространстве, соответствует наклон вихря относительно нормали к этой границе:

$$v = c \sin \alpha \quad (1)$$

где c - скорость света.

Это можно трактовать так, как будто вдоль вихря бежит световая волна и проекция скорости этой волны на границу соответствует скорости перемещения вихря. Массе элементарной частицы в такой модели пропорциональна кинетической энергии среды, образующей вихрь, и поэтому пропорциональна длине вихря. Если обозначить массу покоящейся частицы как m_0 , то ввиду наклона масса движущейся частицы возрастет и станет равной

$$m = \frac{m_0}{\cos \alpha} \quad (2)$$

При этом предполагается, что конец вихря, находящийся на достаточно большом расстоянии от поверхности в «недрах» среды, остается неподвижным. Выраженная через скорость c с помощью (1) эта масса имеет вид $m_0 / \sqrt{1 - V^2/c^2}$ и носит название «релятивистской массы», а m_0 – «массы покоя».

Приведенные выше выражения позволяют определить импульс вихря в виде обычного для классической физики произведения массы на скорость mv или

$$p = m_0 c \operatorname{tg} \alpha \quad (3)$$

При малых углах импульс кроме классического $m_0 v$ содержит дополнительно член, зависящий от куба скорости $\frac{m_0 v^3}{3c^2}$.

Как показано в [1], энергия покоящегося вихря E_0 при соответствующем выборе единиц равна

$$E_0 = m_0 c^2, \quad (4)$$

а энергия движущегося вихря определяется как

$$E = m c^2 \quad (5)$$

При малых углах мы имеем $E = m_0 c^2 + m_0 v^2 / 2 = m_0 c^2 + p^2 / 2 m_0$, т.е. известное в классической механике выражение.

Используя (2), (3) и (5) также нетрудно получить известное из СТО выражение для квадрата энергии

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2 \quad (6)$$

которое по сути является следствием теоремы Пифагора при рассмотрении треугольника на рис.1. работы [1]. Исключая с помощью (2) и (5) массу покоя из последнего выражения, имеем выражение импульса через энергию и скорость

$$p = \frac{E v}{c^2} \quad (7)$$

что с учетом (5) снова приводит к классическому определению импульса $p = m v$.

Для изменения импульса во времени необходимо приложить силу, величина которой зависит от того, совпадает или нет ее направление с направлением движения. В первом случае производная импульса по времени определяется с помощью (1) и (3) как

$$\dot{p} = \frac{m_0 c^2 \dot{\alpha}}{\cos^2 \alpha} = \frac{m_0 c \dot{v}}{\cos^3 \alpha} \quad (8)$$

Величина $m_0 / \cos^3 \alpha$ названа Лоренцем «продольной массой».

Во втором случае, если прилагаемая сила перпендикулярна скорости движения, то изменения угла α не происходит, поэтому вместо частного случая (3), когда имеется лишь одна компонента импульса, нужно использовать общее выражение

$$p = \frac{m_0 c}{\cos \alpha_4} \begin{pmatrix} \cos \alpha_1 \\ \cos \alpha_2 \\ \cos \alpha_3 \\ \cos \alpha_4 \end{pmatrix}, \quad (9)$$

где $\cos \alpha_i$ – направляющие косинусы четырехмерного вектора $p = \{p_i\}$ ($i=1,2,3,4$), $\alpha_4 = \alpha$. Четырехмерная скорость в этом случае определится как

$$v = \{c \cos \alpha_i\} \quad (10)$$

По модулю она равна c . Без ущерба общности примем, что скорость вихря по границе среды имеет направление в плоскости образованной осями 1 и 2, а изменение импульса происходит вдоль оси 3. Тогда из определения (9) получится выражение с «поперечной массой» $m_0 / \cos \alpha$, величина которой равна релятивистской,

$$\dot{p}_3 = \frac{m_0 c \dot{v}_3}{\cos \alpha} \quad (11)$$

Из классической механики известно, что функцию Лагранжа можно представить в виде

$$L = \vec{p} \cdot \vec{V} - E \quad , \quad (8)$$

где стрелки над символами означают трехмерные векторы. Подставляя сюда значения из (4),(9) и (10), мы получим

$$L = -m_0 c^2 \cos \alpha \quad (9)$$

Используя определение скорости (1), это выражение примет тот же вид, что и функция Лагранжа для свободной частицы в специальной теории относительности:

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} \quad . \quad (10)$$

Таким образом, релятивистская механика может быть изложена на более простом геометрическом языке, не требующем введения понятия интервала, которое используется при выводе выражения (10) в теории относительности.

Конечно, уравнение (9) не является точным, поскольку не учитывает поверхностные эффекты, существующие вблизи выхода вихря на граничную гиперповерхность среды и которые, очевидно, играют важную роль в динамике вихря. Поэтому его надо рассматривать как приближение такого же рода, каким является специальная теория относительности при описании движения материальной точки. Однако, как было показано в предыдущих работах, в отличие от последней здесь нет необходимости использовать время иным способом, чем оно используется в классической физике.

Также следует заметить, что зависимость массы от скорости в виде (2) и импульса в виде (3) позволяет получить выражения для энергии (5),(6) и (7), согласующиеся с теми, которые получаются в СТО. Это говорит о том, что возражения Л.В.Окуня против релятивистской массы [2] несущественны в предлагаемом рассмотрении.

[1] В.Скоробогатов. О массе в модели 4D-эфира [article7.html](#) 2007

[2] П.В. Окунь. Понятие массы. (Масса, энергия, относительность) Успехи физических наук, 158, (3), 511-530.